

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/da Larva, nimf 75 ml/da Larva, nimf	-
PATLİCAN	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	50 ml/da Larva, nimf 50 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf	3 gün
ELMA	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Pantonychus ulmi</i>)	50 ml/100 L su yumurta, larva, nimf	7 gün
BAĞ	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 L su yumurta, larva, nimf	7 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

Ürünün Uygulamaya Hazırlanması:
Gerekli miktardaki ilaç önce ayı bir kapta az bir miktarda su ile bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır. Ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

Her türü püskürtücü ile yerden uygulanabilir. Tarla pülverizatörüyle ilaçlama yapılırken yaprak altlarının da ilaçlanabilmesi için sıra arası memelerin takılması tavsiye edilir.
Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci ilaçlama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır.
Erginlere etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır

Kırmızı örümceklerin direnç kazanmasını önlemek için yılda ikiden fazla ilaçlama yapılmalıdır. Klasik akarisitlere direnç kazanmış akarılara da ilaçlama yapılmalıdır. Yılda bir kez uygulanmalıdır. Etkisi 50-60 gün sürer. Kırmızı örümceklerin larva nimleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürlür. Eğer Agrilex doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. İlaçlanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

Devranlı 2. sayfa

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



AGRILEX

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Madde Adı ve Miktarı:

Litrede 50 g Hexythiazox
(4RS-5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

GRUBU	10 A	AKARİSİT
-------	------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİNİ KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA BANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

04. Ekim 2013

Dr. Nevzat BİRİŞİK

Genel Müdür Yardımcısı

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: ZARARLI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
TEHLİKE SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMASI



Xn: ZARARLI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER: Hexythiazox içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solumduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S43: Alevlenmesi durumunda Basınçlı su, CO2, yangın söndürme tozu, köpük, kum kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Hasan Tahiroğlu 0232 075 8604

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Agrilex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10 A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Agrilex'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10 A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı ve kültür gibi kuvvetli alkali ilaçlar dahil pek çok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



AGRILEX

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Madde Adı ve Miktarı:

Litrede 50 g Hexythiazox

(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

GRUBU

10 A

AKARİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.


İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarın. Deriye teması halinde bol su ve sabunla yıkayın. Gözlere bulaşması halinde gözler en az 15 dakika bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlayın. Yutulması halinde bir bardak suya bir çorba kaşığı tuz katılarak hazırlanan tuzlu suyu için veya parmakla boğazın gerisine bastırarak hastayı kusturun. Hastayı temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım isteyin.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-IZMIR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. L.T.Ş. Tİ.
Bekir Saydam Cad. / Pancar / Torbalı / İZMİR

Torbalı / İZMİR

Hasan Tahsiş / 0083 075 3004

MEVZAT EİRİŞİK
Müdür Yardımcısı