

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Serj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/da yumurta, nimf, ergin	21 gün
	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 ml/da yumurta, nimf, ergin	
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/da nimf, ergin	
PATLİCAN	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/da nimf, ergin	3 gün
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/da nimf, ergin	
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/da nimf, ergin	
KARPUZ	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/da nimf, ergin	3 gün
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	
	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	
DOMATES	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	60 ml /100 L su larva, nimf	3 gün
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	
	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	
ÇILEK	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	3 gün
	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	

Diyarı 2 sayfa

AGRI SCIENCES Tarm ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.



Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddelerin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g Spiromesifen 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxazapiridin-4(1H)-on-3-en-4-yl 3,3-dimethylbutanoate

GRUBU	23	AKARİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EYDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİYEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARAYA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 12 SAAT İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Haziran 2014

Net Miktarı:
Azamı Perçende Satış Fiyatı:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
Xi: Tahriş edici N:Çevre için tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi: Tahriş edici

N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Spiromesifen içeriği.
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53: Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 61:Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:
AGRI SCIENCES Tarm ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR.SAN.ve TIC.LTD.Ş.İ.
Bekir Saydam cad/pancar No 31
Torbalı/İZMİR

Hassan Tahsin VD. 0232 864 13 33
Tic. Sic. No 277



HIYAR (Serâ)	Pamuk kırmızı ötümceği (<i>Tetranychus</i> <i>chimabarinus</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	3 gün
KARANFİL (Serâ)	İki noktalı kırmızı ötümcek (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i>)	50 ml/100 L su nimf, ergin	-

KULLANMA ŞEKLİ:**İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:**

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakın olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

İlaçlama Zamanı:

Pamuk: Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümde 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır, toplam 100 yaprakta büyütle sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz'de 5, Ege ve Güneydoğu'da 10 adet Kırmızı ötümeğe ulaşılırsa kaplama ilaçlama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi ilaçlama yapılabilir. Kullanılacak alete göre bir dekara gidecek su miktarı kalibrasyon yapılarak saptanmalı ve belirlenen su miktarına gerekli ilaç eklenmelidir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Karpuz, Hyar: İlk çiçeklemeden itibaren tarlaya köşeden çapraz girilir ve 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarından birer yaprakta olmak üzere toplam 10-20 yaprakta büyütle sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 kırmızı ötümecek sayısına ulaşılmışsa kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Dekara uygulamada önce kalibrasyon yapılarak bir dekara gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gereken miktar ilaç eklenmelidir.

Çilek: Tarlayı temsil eden 50 yaprakçıkta yaprak başına ortalama 15 hareketli birey görüldünce ilaçlama yapılmalıdır. Olgun meyve varsa bekleme süresine uyulmalı veya ilaçlama meyve toplanıktan sonra yapılmalıdır.

Karanfil: Serayı temsil eden 25-30 yaprakta yaprak başına ortalama 3-5 hareketli birey görüldünce ilaçlama yapılmalıdır. Karanfilde % 0,2 oranında yapışmayı sağlayıcı adjuvant kullanılmalıdır. Diğer bitkilerde yayıcı-yapıştırıcı kullanıma gerek yoktur.

Bayaz sinek: 50 yaprakta yaprak başına ortalama Mayıs-Haziran aylarında 0,5-2 larva, Temmuz-Agustos aylarında 2-3 larva, Eylül ayında 3 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

DAYANIKLILIK DURUMU:

Köftex bilinen akaristler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Dayanıklılık olusuna riskini azaltmak için aynı zararlıya karşı bir sezonda 2 defadan fazla kullanılmamalıdır. Gerekliyse farklı şekli farklı bir akaristi kullanılmalıdır.

Devamı 3. sayfada

AGRI SCIENCES
KÖFTEX

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Madde(nin) Adı ve Miktarı: Litrede 240 g Spirromesifen
2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4,4]non-3-en-4-yl 3,3-dimethylbutanoate

GRUBU	23	AKARİSİT
--------------	-----------	-----------------

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KORYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ
"BU ÜRÜN CHERRY DOMATESLERDE KULLANILMAZ"

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İnsanlarda belirgin bir zehirlenme belirtisi saptanmamıştır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deriyle temas halinde; bol su ile yıkanmalıdır. İlaçla bulaşık giysiler çıkarılmalıdır. Göze teması halinde bol suyla en az 15 dakika yıkayınız ve doktora başvurunuz. Etiket ve ambalajı birlikte götürünüz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIMI VE İLAHYANLIKLIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Haziran 2014

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Ergin bal arılarına ve Bombus tozlayıcı arılarına zararlıdır.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağza kapalı olarak gıdalarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açıklanmış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine kalmıştır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.


DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancaç, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCE

TARİHİ VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancaç No:31
Torbalı/İZMİR
Hassan Tahsin VİD 006 023 864 13 33

(Signature)



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Koffex adı bitti koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitti koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Koffex**'in aynı üretim sezonunda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 hariç) bitti koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Büyük insektisit, fungisit ve yaprak gübresi ile karışabilir, ancak uygulamadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.



AGRI
SCIENCES

KOFFEX

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g Spiromesifen
2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4,4]non-3-en-4-yl 3,3-dimethylbutanoate

GRUBU	23	AKARİSİT
-------	----	----------


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIMI ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Haziran 2014

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. Ş. Tİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbalı-İZMİR
Hesap Numarası: 085 070 0804 716 Sic. No:3749



Şirket