

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
ELMA	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>) Akdişen akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	37.5 g/100 L su 30 g/100 L su	7
ARMUT	Armut psilası (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 g/100 L su	7
FASULYE	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	75 g/100 L su	7
BAĞ	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 g/100 L su	7
TURUNÇGİL	Turunçgil kırmızı örümceği (<i>Panonychus citri</i>)	20 g/100 L su	7
ÇİLEK	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 L su	7
PAMUK	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/da	7
GÜL	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 L su	7
KARANFİL	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/100 L su	7

ETKİ ŞEKLİ: Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translamınar özelliğe sahip bir akarisitir. Kırmızı örümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder. İlaçlamalar zamanında yapılmalı, geç kalınmamalı ve mevsim içerisinde aynı etki şekline sahip ilaçla ikiden fazla ilaçlama yapılmamalıdır. Böylece ilacın uzun süre kalıcı etkisinden yararlanılmış olur, hem de direnç oluşumu engellenmiş olur.

Dr. Kadir MELAN
Daire Başkanı

Şu

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L.Ş. Şti.

AGRI SCIENCES
MORENO

İslamabilir Toz (WP)

Aktif Maddemin Adı ve Miktarı: % 20Tebufenpyrad
N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5 - carboxamide

GRUBU	21A	AKARİSİT- İNSEKTİSİT
-------	-----	-------------------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

27 Aralık 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xi: Tahriş edici N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMASI



Xi: Tahriş edici N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER: Tebufenpyrad içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

SS6: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. L.Ş. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Hüseyin Tebşin Vp. 13.01.2013

2 sayfa

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Hazırlanan ilaç mahitül devamlı karıştırılarak bekletilmmeden kullanılır. İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamada her türlü alet kullanılabilir.

Uygulama Zamanı:

Fasulye: Yaprak başına ortalama 3 adet canlı Kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Çiçek: Çiçek ve yeşil meyve döneminde Kırmızı örümcekler görüldüğünde erken dönem uygulaması yapılmalıdır.

Elma: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet Kırmızı Örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Armut: 2.ve 3. dönem nimflerin görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15'inden fazla olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ: Yaprak başına 5-8 adet Kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgil: On yaprakta canlı birey sayısı 4-9 adetten fazla ise ilaçlama yapılmalıdır.

Panuk: Yaprak başına Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 10 adet kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Bitki Tahammülü:

Tavsiye edildiği kültür bitkilerinde, tavsiye edildiği şekilde kullanıldığına herhangi bir fitotoksiste yapmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Moreno adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir.. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Moreno'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21 A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali özellik gösteren ilaçlarla karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır. Karşıma girecek ilaçlar aynı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



MORENO

İslanabilir Toz (WP)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: % 20Tebufenpyrad

N-(4-(tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5 - carboxamide

GRUBU	21A	AKARİSİT- İNSEKTİSİT
-------	-----	-------------------------

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Cilde temas halinde; ilaçı bulamaç elbiseleri derhal çıkarınız ve ilacın deri ile temas eden kısımlarını sabunlu su ile iyice yıkayınız. Göze temas halinde; göz kapaklarını açık tutarak temiz su ile asgari 15 dakika yıkayın ve derhal doktora başvurun. Solunması halinde temiz havaya çıkınız. Ağz yoluyla alınması halinde; doktor nezaretinde hastayı kusturunuz. Tıbbi yardım almaz. İlaç etiketini yanınızda bulundurunuz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:
Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.


ULUSAL ZEHRİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

27 Aralık 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAROL EDİLMİŞTİR.

Dr. Kadir MELAN

Daire Başkanı



24

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kumullarına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar
Torbalı / İZMİR

İmza: Bekir Saydam