

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
KARANFİL	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 ml/da	1 gün
DOMATES (Tarla-Sera)	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml/da (larva, nimf, ergin)	1 gün
HIYAR (Sera)	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml/100 L su (larva, nimf, ergin)	1 gün
ÇİLEK	Pamuk kırmızı örümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	60 ml/100 L su (larva, nimf, ergin)	1 gün

Nimadel Kırmızı örümceklerin kontrolünde kullanılan seçici bir akarisitir. Nimadel karanfil ve domateste Kırmızı örümceklerin tüm hareketli dönemlerine karşı etki ederek ani etkili ve uzun süreli kalıcı bir etki sağlar.

ETKİ ŞEKLİ:

Kırmızı örümceklerin sinir sistemini bozarak hiperaktiviteye (sürekliliği hızlı hareketlilik) neden olur. İlaç ile temas eden Kırmızı örümceklerin beslenmesi 3 saat içerisinde durur. **Örümcekler 3-4'üncü günde** görülmeye başlar. Nimadel yaprak üzerinde uzun süreli kalıcı etkiye sahip kontakt etkili bir akarisitir. Bombus arlarına herhangi bir yaprak etkiyi yoktur. Faydalı böceklerle ve Kırmızı örümceklerin doğal düşmanlarına karşı, etkiniyetli olması sayesinde entegre mücadele programlarında (IPM) güvenle kullanılabilir.

Dr. Y. AYRAM
Detaylı Sorular İçin

SAY

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lau. Şti.

AGRI SCIENCES

NIMADEL

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı : Litrede 240 g
Bifenazate

Isopropyl 3-(4-methoxybipenyl-3-yl)carbazate

GRUBU	ÜN	AKARİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇ BİTKİ ÜZERİNDE KURUMADAN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İLAÇ BİTKİ ÜZERİNDE KURUMADAN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

21 Kasım 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı) kapsamına tabi değildir.

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi: TAHRİŞ EDİCİ

İÇİNDEKİLER:

BİFENAZATE İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE

AÇIKLAMASI:

R36: Gözleri tahriş eder.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bektir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARLA VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bektir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

1 Hasan Tahsin V.D. 0232 864 13 33 Pn 3749

KULLANMA ŞEKLİ:**Uygulama Zamanı:**

Kararıfide: İlaç bitkilerle çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yapıpraktık ortalama 10 adet Kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.

Domates ve Hıyarda: İlk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında Kırmızı örümcek nimf ve erginleri bir büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı **Domateste** 20,

Hıyarda 10 adettir. Bir yaprağa düşen canlı Kırmızı örümcek sayısı, sayılan yaprak adedine bölünerek hesaplanır. Yaprak başına 5 adet canlı Kırmızı örümcek bulunduğunda mücadelede karar verilir.

Çilek: Bitkilerin alt ve orta bölümlerinden alınan en az 50 yaprakçıkta yaprakçık başına hareketli dönemde ortalama 15 ve üzerinde Kırmızı örümcek olması durumunda ilaçlama yapılır.

İlaçlama Tekniği ve Uygulama Şekli:

İlaçlamadan başatılı bir sonuç alınabilmesi için tüm bitkilerin bütün organlarını ve yaprakların her iki yüzünü de kaplayacak şekilde uygulama yapılması şarttır. Atomizör yaprakları alabora edip tek yüzünü ilaçladığından, sırt pülvemizaförü veya yaprak altı memeleri de bulunan ilaçlama aletleri tercih edilmelidir.

İlaçlama rüzgârsız bir havada sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşamüzeri yapılmalıdır. Sulu formülasyon olan ilaç suyla hemen karıştırdıktan her türlü aletle kullanılabilir. İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelerine uygun olarak kullanılması şarttır. İlaçlama aletinin deposu yarıya yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak, depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan mahhül aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Kalibrasyon:

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Nimadel adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GrupUN olarak sınıflandırılmış bir akaristiftir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Nimadel aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup UN harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı, Kültür ve yazlık yağ ile karışmaz.



NIMADEL

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g

Bifenazate

Isopropyl 3-(4-methoxybipenyl-3-yl)carbazate

GRUBU	ÜN	AKARİSİT
-------	----	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri ve gözde tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastayı ilacli yerden uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. İlaçla bulaşık elbiselerini derhal çıkarın. Derye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkayın. Hastayı sakın bir yere götürün. İlacın yutulması halinde mideden tahliyesine doktor karar vermelidir.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

ANTİREZİSTANS (BAĞIŞIKLIK ÖNLEYİCİ) PROGRAMLARI:**PROGRAMLARI:**

*Bir üretim sezonu boyunca en fazla bir kez, popülasyonun yüksek olduğu durumlarda ise yedi gün ara ile iki kez kullanılmalıdır.

*Bir sezonda Kırmızı örümcek ile mücadelede 2'den fazla uygulama gerekiyor ise diğer uygulamalar için başka etki mekanizmasına sahip akaristitler ile dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

*Antirezistans (bağışıklık önleyici) programlarında rahatlıkla uygulanabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*İlaçlamadan 6 saat sonra yağın yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

*İLACI KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Seydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHA VE İLAÇ ÜR SAN VE TİC LTD ŞTİ.

Bekir Seydam Cad. Pancar No:31

Torbali-İzmir

Hasan Tahsin V/D 007 N/5 2604 Tic Sic No 3740

21 Kasım 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA TEKRAR KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AGRI SCIENCES

AGRI SCIENCES