

İmal Tarihi:
Soni Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Rollsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE İHSAAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Pauanonychus ulmi</i>) İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Ak diken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	20 ml / 100 L su	28 gün
ŞEFTALİ	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml / 100 L su	21 gün
BAĞ	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml / 100 L su	56 gün
PATLACAN	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
FASULYE	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml / da	—
HIYAR	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml / da	—
SOYA	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml / da	—

KULLANMA ŞEKLİ

Yılda bir kez kullanılır.
Avrupa kırmızı örümceğine karşı kışlık yumurtalar açılmadan önce, yani ağaçların pembe tonunu çıkarmaya başlamadan önce ilaçlama yapılmalıdır. Bu devre kaçınılmazı taktirde yaprak başına ortalamada 1-2 ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
İla noktalı kırmızı örümcek, Ak diken akarı ve diğerlerinin hakim olduğu bahçelerde yapraklarda ilk hareket görülür görülmez yani taç yapraklarının döktülmesi ile mayla tutumu zamanı arasında ilaçlama yapılmalıdır.
Bağ, Patlacan, Fasulye, Hiyar ve Pamukta İla noktalı kırmızı örümcek yumurtalarına karşı ilk örümcek hareketi görüldüğünde (yaprak başına 1-2 ergin) ilaçlama yapılmalıdır. Alet yarıya kadar su ile doldurulur. Daha sonra gerekli miktarda ilaç konur ve karıştırılarak su ilave edilir.


İlaçlamadan en iyi sonucu alınabilmesi için iyi bir kaplama ile mümkündür. Ağaçların her tarafı yıkanır gibi ilaçlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Vistro 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10, A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlı kullanılması, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Vistro 500 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplama uygulama sayısını aşmaması, Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10, A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

KARİŞİMLİLİK DURUMU:

Diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak uygulanabilir.



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd.



VISTRO 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 500 g/L Clofentezine
3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine

GRUBU	10, A	AKARİSİT
-------	-------	----------

ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İNSAN VE HAYVAN GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirli bir semptomu yoktur, muhtemelen halsizlik görülür. Yüksek miktarda alındığı takdirde göz ve deride yanmalara sebebiyet verir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İnsan ve hayvanlara toksitesi düşüktür, genel koruma tedbirlerine dikkat ediniz. Deriye bulaşması halinde bol sabunlu su ile yıkayınız. Zehirlenme halinde, hastayı dinlendiriniz ve derhal doktor çağırınız, hastayı ilaçla solumaya uzaklaştırınız. İlaç etkisi ve ambalajını doktora gösteriniz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Hastayı kusturmaya çalışmayınız. İlaç su ile mideyi yıkayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

15 Aralık 2014

GIDA TABAHI VE İLAÇ YANLIĞI BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARİŞİMLİLİK BİRİMİ

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

TEHLİKE SEMBOLÜ



N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER

CLOFENTEZİNE İÇERİR.

RİSK İBARELERİ:

R52: Sucul organizmalar için zararlıdır.

R53: Sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S29: Kanalizasyona boşatmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / etkin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

* Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

* Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

* Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

* Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

* Balıklar için zehirlidir.

* Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak güdülerden uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine kullananı. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 70

AGRI SCIENCES

TARİHİ VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tarih: 15 Aralık 2014

Şirket Adı: AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket Adı: AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.